


ATLAS  
DE LA  
FLORE ALPINE.

Tome. IV.


QK315

.C58

t.4









# ATLAS

DE LA

# FLORE ALPINE

---

*Publié par le Club alpin allemand  
et autrichien.*

---

**Tome IV (Planches 301 à 400).**



GENÈVE & BALE  
LIBRAIRIE GEORG & Co

Lyon, même maison.

1899

Tous droits réservés.

1000


t. 4

# Index des planches du tome IV.


(Planches 301 à 400.)

Les plantes dont les noms sont accompagnés d'un \* sont photographiées d'après nature.

- |   |   |
|---|---|
| 301. <i>Calluna vulgaris</i> Salisb.        | 351. <i>Gentiana obtusifolia</i> Wild.*     |
| 302. <i>Erica carnea</i> L.                 | 352. » <i>ciliata</i> L.*                   |
| 303. <i>Loiseleuria procumbens</i> Desv.*   | 353. » <i>verna</i> L.*                     |
| 304. <i>Rhododendron Chamacistus</i> L.     | 354. » <i>Favrati</i> Rittener.*            |
| 305. » <i>hirsutum</i> L.*                  | 355. » <i>imbricata</i> Frœl.*              |
| 306. » <i>ferrugineum</i> L.*               | 356. » <i>bavarica</i> L.*                  |
| 307. <i>Pyrola uniflora</i> L.              | 357. » <i>pumila</i> Jacq.*                 |
| 308. <i>Armeria alpina</i> Wild.            | 358. <i>Pleurogyne carinthiaca</i> Gris.    |
| 309. <i>Primula Auricula</i> L.*            | 359. <i>Swertia perennis</i> L.*            |
| 310. » <i>carniolica</i> Jacq.              | 360. <i>Polemonium coeruleum</i> L.         |
| 311. » <i>latifolia</i> Lap.*               | 361. <i>Eritrichium nanum</i> Schrad.*      |
| 312. » <i>œnensis</i> Thom.*                | 362. <i>Pulmonaria styriaca</i> A. Kern.*   |
| 313. » <i>viscosa</i> Vill.                 | 363. <i>Myosotis alpestris</i> Schmidt.*    |
| 314. » <i>villosa</i> Jacq.*                | 364. <i>Cerinthe alpina</i> Kit.            |
| 315. » <i>Wulfeniana</i> Schott.*           | 365. <i>Scopolia carniolica</i> Jacq.*      |
| 316. » <i>Clusiana</i> Tausch.*             | 366. <i>Linaria alpina</i> Mill.*           |
| 317. » <i>glutinosa</i> Wulf.*              | 367. <i>Scrophularia Hoppei</i> Koch.*      |
| 318. » <i>minima</i> L.*                    | 368. <i>Digitalis ambigua</i> Murr.*        |
| 319. » <i>farinosa</i> L.*                  | 369. <i>Erinus alpinus</i> L.*              |
| 320. » <i>longiflora</i> All.*              | 370. <i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.      |
| 321. » <i>elatior</i> Jacq.*                | 371. <i>Pæderota Bona Rota</i> L.           |
| 322. <i>Androsace Chamaejasme</i> Host.     | 372. » <i>Ageria</i> L.*                    |
| 323. » <i>villosa</i> L.*                   | 373. <i>Veronica saxatilis</i> Jacq.*       |
| 324. » <i>obtusifolia</i> All.*             | 374. » <i>fruticulosa</i> L.*               |
| 325. » <i>lactea</i> L.*                    | 375. » <i>alpina</i> L.                     |
| 326. » <i>carnea</i> L.                     | 376. » <i>bellidioides</i> L.*              |
| 327. » <i>vitaliana</i> Lap.                | 377. » <i>aphylla</i> L.*                   |
| 328. » <i>Hausmanni</i> Leyb.               | 378. » <i>latifolia</i> L.                  |
| 329. » <i>Helvetica</i> Gaud.*              | 379. <i>Euphrasia salisburgensis</i> Funk.* |
| 330. » <i>imbricata</i> Lam.                | 380. » <i>minima</i> Jacq.*                 |
| 331. » <i>glacialis</i> Hoppe.*             | 381. <i>Bartschia alpina</i> L.*            |
| 332. <i>Cortusa Matthioli</i> L.            | 382. <i>Rhinanthus lanceolatus</i> Neilr.*  |
| 333. <i>Soldanella alpina</i> L.*           | 383. <i>Pedicularis rosea</i> Wulf.*        |
| 334. » <i>pusilla</i> Baumg.*               | 384. » <i>acaulis</i> Wulf.                 |
| 335. » <i>minima</i> Hoppe.*                | 385. » <i>geminata</i> Port.                |
| 336. <i>Cyclamen europæum</i> L.*           | 386. » <i>asplenifolia</i> Floerke.*        |
| 337. <i>Gentiana Clusii</i> Perr. et Song.* | 387. » <i>rostrata</i> L.                   |
| 338. » <i>Kochiana</i> Perr. et » *         | 388. » <i>cæspitosa</i> Sieb.               |
| 339. » <i>Frœlichii</i> Jan.*               | 389. » <i>incarnata</i> Jacq.*              |
| 340. » <i>frigida</i> Hænke.*               | 390. » <i>verticillata</i> L.*              |
| 341. » <i>lutea</i> L.                      | 391. » <i>recutita</i> L.                   |
| 342. » <i>purpurea</i> L.                   | 392. » <i>Oederi</i> Vahl.                  |
| 343. » <i>punctata</i> L.*                  | 393. » <i>elongata</i> A. Kern.*            |
| 344. » <i>pannonica</i> Scop.*              | 394. » <i>foliosa</i> L.                    |
| 345. » <i>asclepiadæa</i> L.*               | 395. <i>Melanpyrum silvaticum</i> L.        |
| 346. » <i>prostrata</i> Hænke.              | 396. <i>Tozzia alpina</i> L.*               |
| 347. » <i>utriculosa</i> L.*                | 397. <i>Orobanche flava</i> Mart.*          |
| 348. » <i>nivalis</i> L.                    | 398. <i>Pinguicula vulgaris</i> L.*         |
| 349. » <i>nana</i> Wulf.*                   | 399. » <i>alpina</i> L.*                    |
| 350. » <i>tenella</i> Rottb.*               | 400. <i>Globularia cordifolia</i> L.        |







301. *Calluna vulgaris*, Salisb. — Besenheide.

Bruyère commune. — Common Heath.

Tourbes, landes et pentes arides des Alpes. Juillet—Octobre.





302. *Erica carnea*, L. — Rosenheide.

Bruyère rose. — Alpine Heath.

Pentes boisées et bords des torrents. Mars — Juin.







303. *Loiseleuria procumbens*, Desv. — Alpenheide.  
Azalée des Alpes. — Alpine Azalea.

Pentes arides et sèches des régions supérieures. Juillet — Août.





**304.** *Rhododendron Chamaecistus*, L. — Zwerg-Alpenrose.

Rosage faux Ciste. — Rockrose flowered *Rhododendron*.

Pentes ombragées de la région alpine et sous alpine dans les Alpes orientales. Juin — Juillet.







305. *Rhododendron hirsutum*, L. — Wimperhaarige Alpenrose.  
Rosage cilié. — Ciliate *Rhododendron*.

Alpes calcaires. Juin — Août.





306. *Rhododendron ferrugineum*, L. — Rostfarbige Alpenrose.

✓ Rosage des Alpes. — Alpine Rhododendron

Alpes, surtout granitiques. Juin — Août.





307. *Pirola uniflora*, L. — Einblüthiges Wintergrün.  
Pyrole uniflore. — Oneflowered Wintergreen.

Bois de la région montagneuse. Juin — Juillet.





308. *Armeria alpina*, Willd. — Alpengrasnelke.

Armérie des Alpes. — Alpine Sea Pink.

Pentes gazonnées et ensoleillées des Alpes. Juin — Août.







**309.** *Primula Auricula*, L. — Aurikel.

Auricule des Alpes. — Alpine Auricule.

Rochers des Alpes calcaires dans la région alpine et sous alpine. Mai — Juillet.





310. *Primula carniolica*, Jacq. — Krainer Aurikel.

Primevère de Carniole. — Carniolian Primrose.

Fentes des rochers dans les Alpes de Carinthie et Carniole. Mai — Juin.





311. *Primula latifolia*, Lap. — Breitblättrige Primel.  
 Primevère à feuilles larges. — Broadleaved Primrose.  
 Pentes des rochers ardoisières dans le Alpes occidentales et orientales. Juin - Août.







**312.** *Primula oenensis*, Thom. — Inn-Primel.

Primevère de l'Inn. — Inn's Primula.


Pentes rocheuses et fraîches des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Juillet.





**313.** *Primula viscosa*, Vill. — Klebrige Primel.  
Primevère visqueuse. — Viscous Primula.

Fentes des rochers granitiques des Alpes. Avril—Juillet.





314. *Primula villosa*, Jacq. — Zottige Primel.

Primevère velue. — Hairy Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. Mai—Juin.





**315.** *Primula Wulfeniana*, Schott. — Wulfen's Primel.

: Primevère de Wulfen. — Wulfen's Primula.

Fentes des rochers calcaires des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Août.







**316.** *Primula Clusiana*, Tausch. — Clusius' Primel.

Primevère de Clusius. — Clusius' Primula.

Fentes des rochers des Alpes orientales, sur le versant septentrional. Mai — Juillet.





317. *Primula glutinosa*, Wulf. — Blauer Speik.

Primevère glutineuse. — Glutinous Primula.

Alpes granitiques des Alpes orientales dans les rochers de la région alpine. Juin — Août.





318. *Primula minima*, L. — Zwergprimel.

Primevère minime. — Minime Primula.

Pâturages et rochers des Alpes orientales dans la région alpine. Juni — Août.







319. *Primula farinosa*, L. — Mehlprimel.  
Primevère farineuse. — Bird's-eye Primrose.


Prairies et pâturages frais des Alpes. Avril — Juin.





320. *Primula longiflora*, All. — Langblumige Primel.  
Primevère à longues fleurs. — Longflowered Primrose.

Prairies des Alpes granitiques (disséminé). Juin — Juillet.





**321.** *Primula elatior*, Jacq. — Hochstengliger Himmelschlüssel.  
Primevère inodore. — Oxlip.

Bois et prairies des régions inférieures. Mai—Juillet.





**322.** *Androsace Chamaejasme*, Host. — Zwerg-Mannsschild.

*Androsace trompeuse*. — Ciliated *Androsace*.

Pâturages des Alpes calcaires dans la région alpine. Mai — Août.







**323.** *Androsace villosa*, L. — Zottiger Mannsschild.

*Androsace velue*. — Hairy Androsace.

Pâturages rocheux des Alpes occidentales et orientales calcaires, dans la région alpine et sous alpine.  
Juillet — Août.






324. *Androsace obtusifolia*, All. — Stumpfblättriger Mannsschild.

*Androsace* à feuilles obtuses. — Blunt leaved *Androsace*.

Pâturages et pentes sèches de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.





325. *Androsace lactea*, L. — Milchweisser Mannsschild.  
*Androsace lactée*. — Milkwhite Androsace.

Pâturages rocheux des Alpes calcaires (disséminé). Juin — Août.





326. *Androsace carnea*, L. — Fleischrother Mannsschild.  
*Androsace carnée*. — Flesh coloured *Androsace*.  
 Pâturages des Alpes granitiques centrales et méridionales. Juillet—Août.







327. *Androsace Vitaliana*, Lap. — Goldprimel.

*Androsace* jaune. — Yellow *Androsace*.

es occidentales, centrales et tyroliennes sur les pentes arides de la région alpine. Juin — Juillet.






328. *Androsace Hausmanni*, Leyb. — Hausmann's Mannsschild.

*Androsace de Haussmann*. — Hausmann's *Androsace*.

Fentes des rochers calcaires et dolomitiques des Alpes orientales (disséminée). Juillet — Aout.





329. *Androsace helvetica*, Gaud. — Schweizer Mannsschild.  
*Androsace Helvétique*. — Swiss *Androsace*.

Fentes des rochers calcaires de la région alpine. Disséminé. Juillet — Août.





330. *Androsace imbricata*, Lam. — Dachziegelblättriger Mannsschild.

*Androsace argentée*. — Silverleaved *Androsace*.

Fentes des rochers granitiques et secs de la région alpine (disséminé). Juin — Juillet.








**331.** *Androsace glacialis*, Hoppe. — Alpen-Mannsschild.

*Androsace glaciale*. — Glacial *Androsace*.

Morâines et pierriers granitiques des Alpes. Juillet — Août.





332. *Cortusa Matthioli*, L. — Heilglöckchen.

Cortuse de Matthiöle. — Alpine Sanicle.

Lieux frais des Alpes occidentales, méridionales et orientales, dans la région sous alpine.  
Mai — Juillet.





333. *Soldanella alpina*, L. — Gemeines Alpenglöckchen.  
Soldanelle. — Soldanella.


Pentes gazonnées et humides des Alpes. Mai — Août.





**334.** *Soldanella pusilla*, Baumg. — Kleines Alpenglöckchen.  
Petite Soldanelle. — Little Soldanella.

Pâturages frais des Alpes orientales dans la région alpine. Juin — Août.







35. *Soldanella minima*, Hoppe. — Zwerg-Alpenglöckchen.  
Soldanelle minime. — Minime Soldanella.

Alpes calcaires orientales dans les zones supérieures. Juin — Juillet.





336. *Cyclamen europaeum*, L. — Erdscheibe.

Cyclame d'Europe. — Alpine Sowbread.

Pentes pierreuses des Alpes calcaires dans la région montagneuse. Juillet—Septembre.





337. *Gentiana Clusii* Perr. Song. — Clusius' Enzian.  
Gentiane de Clusius. — Clusius's *Gentianella*.

Pâturages et pentes herbeuses des Alpes. Mai — Août.





338. *Gentiana Kochiana*, Perr. et Song. — Stengelloser Enzian.  
Gentiane de Koch. — Gentianelle.

Pâturages et pentes herbues des Alpes granitiques. Juin — Juillet.







339. *Gentiana Froelichii*, Jan. — Fröhlich's Enzian.

Gentiane de Froelich. — Froelich's Gentian.


Rochers des zones élevées des Alpes orientales. Août — Septembre.





**340.** *Gentiana frigida*, Hänke. — Kälteliebender Enzian.  
Gentiane des frimas. — Gentian of the cold region.

Alpes granitiques de la Styrie. Juillet — Août.





**341.** *Gentiana lutea*, L. — Gelber Enzian.

*Gentiane jaune*. — Yellow Gentian.

Montagnes calcaires. Juillet—Août





342. *Gentiana purpurea*, L. — Purpurrother Enzian.

Gentiane pourpre. — Brown Gentian.

Habitat : montagnes de la région alpine et sous alpine dans les Alpes centrales et tyroliennes. Juillet — Août.








343. *Gentiana punctata*, L. -- Punktirter Enzian.  
Gentiane ponctuée. — Dotted Gentian.


Pâturages des Alpes dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Août.





**344.** *Gentiana pannonica*, Scop. --- Pannonischer Enzian.  
Gentiane de Hongrie. — Hungarian Gentian.

Pâturages des Alpes orientales dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Septembre.






345. *Gentiana asclepiadea*, L. — Schwalbenwurz-Enzian.

*Gentiane asclépiade* — Willow Gentian.


Pentes boisées et humides de la région montagneuse. Août — Septembre.





346. *Gentiana prostrata*, Hänke. — Niedergestreckter Enzian.  
*Gentiane couchée*. — Prostrate Gentian.


Gazons des Alpes orientales dans la région alpine. Juillet—Août.







347. *Gentiana utriculosa*, L. — Blasiger Enzian.  
Gentiane à calice renflé. — Inflated Gentian.  
Prairies humides des Alpes. Juin — Août.





348. *Gentiana nivalis*, L. — Schnee - Enzian.

Gentiane des neiges. — Snow Gentian.

Pentes gazonnées de la région alpine. Juillet — Août.






349. *Gentiana nana*, Wulf. — Zwergenzian.

*Gentiane naine*. — Dwarf-Gentian.

Moraines glaciaires supérieures des Alpes-tyroliennes. Juillet — Août.





350. *Gentiana tenella* Rottb. — Zarter Enzian.

*Gentiane grêle.* — Tender Gentian.

Moraines et pentes des régions supérieures. Juillet — Août.







**351.** *Gentiana obtusifolia*, Willd. — Stumpfblättriger Enzian.  
Gentiane aux feuilles obtuses. — Blunt-leaved Gentian.


Prairies et pâturages des Alpes orientales. Juin — Septembre.






**352.** *Gentiana ciliata*, L. — Gefranster Enzian.  
Gentiane ciliée. — Ciliate Gentian.

Pentes arides de la région sous alpine et montagneuse. Septembre — Novembre.





353. *Gentiana verna*, L. — Frühlings-Enzian.  
Gentiane printanière ou Oeil de Chat. — Vernal Gentian.  
Prairies des Alpes. Mars — Juillet.





354. *Gentiana Favratii*, Rittener. — Kurzblättriger Enzian.

Gentiane de Favrat. — Favrat's Gentian.

Pentes rocheuses des Alpes calcaires, ici et là, dans la région alpine. Juin — Juillet.







- 355.** *Gentiana imbricata*, Fröl. — Dachziegelblättriger Enzian.  
 Gentiane à feuilles imbriquées. — Imbricateleaved Gentian.  
 Pentes fraîches des Alpes orientales dans la zone supérieure. Juillet—Août.





5. *Gentiana bavarica*, L. — Baierischer Enzian  
Gentiane de Bavière. — Bavarian Gentian.

*Gentiana bavarica*, L. — Baierischer Enzian. — Gentiane de Bavière. — Bavarian Gentian.





357. *Gentiana pumila*, Jacq. — Kleiner Enzian.

*Gentiane pumile*. — Pumile Gentian.

Pâturages et prairies de la région alpine dans les Alpes orientales. Juin — Août.





358. *Pleurogyne carinthiaca*, Griseb. — Fransenkante.

*Pleurogyne*. — *Pleurogyne*.

Alpes de Saas de Glaris et de la Carinthie dans les gazons frais de la région alpine et sous alpine.  
Juillet — Août







359. *Swertia perennis*, L. — Tarant.

*Swertie vivace*. — Marsh *Swertia*.

Terrains tourbeux de la région sous alpine et montagneuse. Juillet — Août





360. *Polemonium coeruleum*, L. — Sperrkraut.

Polémoine. — Jacob's Ladder.

Prairies humides des Alpes orientales dans la région montagnarde et sous alpine. Juin—Juillet.





361. *Eritrichium nanum*, Schrad. — Himmelsherold.

Roi des Alpes. — King of the Alps.


Pierriers des hautes altitudes. Juillet—Août.





362. *Pulmonaria styriaca*, A. Kern. — Steierisches Lungenkraut.  
Pulmonaire de Styrie. — Styrian Lungwort.

Région boisée des Alpes styriennes. Avril—Juin.








363. *Myosotis alpestris*, Schmidt. — Alpen - Vergissmeinnicht.  
*Myosotis des Alpes*. Alpine Forget - me - not.

Prairies des Alpes. Juin — Septembre.





364. Cerinthe alpina, Kit. — Alpen-Wachsblume.

Mélinet des Alpes. Alpine Honeywort.

Pâturages rocheux de la région alpine. Juin—Août.





365. *Scopolia carniolica* Jacq. — Scopolie.  
Scopoline. — Scopoline.

Pentes boisées des Alpes orientales. Avril—Mai.





366. *Linaria alpina*, Mill. — Alpenleinkraut.

Linaire des Alpes. — Alpine Toad-Flax.

Sables, moraines et pierriers des Alpes. Juin—Octobre.







367. *Scrophularia Hoppei*, Koch. — Hoppe's Braunwurz.

Scrofulaire de Hoppe. Hoppe's Figwort.

Eboulis rocheux de la région subalpine et montagneuse. Juin — Août.





368. *Digitalis ambigua*, Murr. — Gemeiner Fingerhut.

Digitale à grandes fleurs. — Largeflowered Foxglove.

Pentes rocheuses et boisées de la région sous alpine et montagneuse. Juin — Août





369. *Erinus alpinus*, L. — Leberbalsam.

Erine des Alpes. — Wall Erinus.

Rochers des Alpes calcaires. Juin — Août.





370. *Wulfenia carinthiaca*, Jacq. — Wulfenie.  
Wulfénie. — Wulfenia.

Alpes de la Carinthie dans la région alpine. Juin — Août.







371. *Paederota Bonarota*, L. f. Manderle.

Bonerote blue. — Blue *Paederota*.

Lieux rocheux des Alpes du Tyrol méridional et de la Styrie. Juin — Juillet.





**372.** *Paedarota Ageria*, L. — Gelber Ehrenpreis.  
Bonarote jaune. — Yellow *Paederota*.

Lieux rocheux des Alpes méridio-orientales. Juin — Août.





373. *Veronica saxatilis*, Jacq. - Blauer Felsehrenpreis.  
Véronique saxatile. — Saxatile speedwell.

Lieux rocheux des Alpes. Juin—Août.





**374.** *Veronica fruticulosa*, L. — Rother Felsehrenpreis.

Véronique petit arbuste. — Shrublike Speedwell.

Lieux rocheux des Alpes. Juillet — Septembre.








375. *Veronica alpina*, L. — Alpenehrenpreis.

Véronique des Alpes. — Alpine Speedwell.

Région alpine et sous alpine dans les gazons. Juillet — Août.






**376.** *Veronica bellidioides*, L. — Maassliebchenblättriger Ehrenpreis.  
Véronique à feuilles de Pâquerettes. — Daisylike speedwell.  
Pâturages secs de la région alpine. Juillet—Août.





**377.** *Veronica aphylla*, L. — Stengelblattloser Ehrenpreis.  
Véronique aphyllé. — Aphyllé Speedwell.

Pentes rocheuses et herbeuses des hautes altitudes. Juillet — Août.





378. *Veronica latifolia*, L. — Breitblättriger Ehrenpreis.  
Véronique à feuilles larges. — Broadleaved Speedwell.

Région montagnaise et boisée. Juin — Juillet.







379. *Euphrasia salisburgensis*, Funk. — Salzburgischer Augentrost.  
 Euphrase de Salzburg. — Eyebright of Salzburg.  
 Prairies-et pâturages des Alpes. Août—Septembre.





**380.** *Euphrasia minima*, Jacq. — Zwerg - Augentrost.  
Euphrase naine. — Dwarf Eyebright.

Pâturages des Alpes. Juillet — Septembre.






381. *Bartsia alpina*, L. — Alpenhelm.

Bartsie des Alpes. — Alpine Bartsia.

Prairies rocheuses et pentes arides de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.





382. *Rhinanthus lanceolatus*, Neilr. — *Alectorolophus-Rhinanthus*.  
Cocriste lancéolé. — Lanceolate Rattle.

Prairies des régions inférieures. Juillet — Août.







383. *Pedicularis rosea*, Wulf. — Rosenrothes Läusekraut.  
Pédiculaire rose. — Pink Lousewort.

Alpes occidentales et orientales (rare) dans la région alpine et sous alpine. Juillet—Aout.





384. *Pedicularis acaulis*, Wulf. — Stengelloses Läusekraut.

Pédiculaire acaule. — Sessile flowered Lousewort.

Alpes méridio-orientales, dans les lieux ombragés de la région alpine et sous alpine. Août — Juin.





385. *Pedicularis geminata*, Port. — Blüthenarmes Läusekraut.  
Pédiculaire géminée. — Fewflowered Lousewort.

Alpes orientales calcaires dans les pâturages et les escarpements rocheux de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.





**386.** *Pedicularis asplenifolia*, Floerke. — Streifenfarnblättriges  
Läusekraut.  
Pédiculaire à feuilles d'*Asplenium*. — *Asplenium* leaved Lousewort.  
Alpes granitiques orientales dans la région alpine. Juillet — Août.








387. *Pedicularis rostrata*, L. — Geschnäbeltes Läusekraut.  
Pédiculaire à bec crochu. — Crooked Lousewort.

Pentes herbeuses des régions supérieures dans les Alpes. Juillet — Août.





388. *Pedicularis caespitosa*, Sieb. — Rasenbildendes Läusekraut.  
Pédiculaire cespiteuse. — Caespitous Lousewort.

Pâturages rocheux de la région alpine dans les Alpes orientales. Juillet — Août.





389. *Pedicularis incarnata*, Jacq. — Fleischrothes Läusekraut.  
 Pédiculaire incarnat. — Fleisch coloured Lousewort.  
 Pâturages de la région alpine dans les Alpes orientales et centrales. Juin — Août.





390. *Pedicularis verticillata*, L. — Quirblättriges Läusekraut.  
Pédiculaire en verticille. — Verticillated Lousewort.

Prairies fraîches des Alpes. Juin — Août.







391. *Pedicularis recutita*, L. — Ungeschnäbeltes Läusekraut.  
Pédiculaire édentée. — Dissected Lousewort.

Prairies humides des Alpes. — Juillet—Août.





392. *Pedicularis Oederi*, Vahl. — Öder's Läusekraut.

Pédiculaire d'Oeder. — Oeder's Lousewort.

aux humides et rocheux des Alpes septentrionales, piémontaises et autrichiennes. Juillet — Août.





393. *Pedicularis elongata*, A. Kern. — Langtraubiges Läusekraut.  
Pédiculaire à grappe allongée. — Longeared Lousewort.  
Dolomites et pentes méridionales des Alpes orientales. Juillet — Août.





394. *Pedicularis foliosa*, L. — Blattrreiches Läusekraut.

Pédiculaire feuillée. — Strongleaved Lousewort.

Escarpements herbeux et frais de la région sous-alpine et montagnaise. Juin — Août.







**395.** *Melampyrum sylvaticum*, L. — Wald-Wachtelweizen.  
Mélampyre des forêts. — Wood's Cow Wheat.

Liens boisés et frais des Alpes. Juin — Août





396. *Tozzia alpina*, L. — Alpenrachen.

Tozzie des Alpes. — Alpine Tozzia.

Lièux frais et couverts de la région montagneuse et boisée. Juni — Août.





397. *Orobanche flava*, Mart. — Gelbe Sommerwurz.  
*Orobanche fauve*. — Yellow Broom Rape.

Dans la région montagneuse sur les *Tussilages* et *Adenostyles*. Juin — Juillet.





**398.** *Pinguicula vulgaris*, L. — Gemeines Fettkraut.  
Grassète vulgaire. — Common Butterwort.  
Rochers moussus et lieux humides des Alpes. Avril—Juin.







399. *Pinguicula alpina*, L. — Alpen-Fettkraut.

Grassète des Alpes. — Alpine Butterwort.

Lieux humides de la région alpine et sous-alpine. Juin — Août.





**400.** *Globularia cordifolia*, L. — Herzblättrige Kugelblume.  
Globulaire à feuilles en coeur. — Heartleaved Globularia.

Pentes sèches et rocheuses des Alpes. Mai—Août.







New York Botanical Garden Library  
QK 315 .C58 v.1 4  
Correvon, Henry/Atlas de la flora alpine



3 5185 00108 2484



